

# E. Tabellarische Übersicht des Impfkalenders für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

## 1. Impfkalender des kostenfreien Kinderimpfprogramms

### Säuglinge und Kleinkinder

| Alter→<br>↓ Impfung   | 1. Lebensjahr  |                          |                          |          |  |   | 2. Lebensjahr |
|---|--|--------------------------|--------------------------|----------|--|---|---------------|
|   | 7. Woche   | 3. Monat                 | 5. Monat                 | 6. Monat | 11. Monat                                  | 12. Monat   |               |
| <b>Rotavirus (RV)</b>   | RV<br>2 bzw. 3 Teilimpfungen in Abhängigkeit vom verwendeten Impfstoff, Abstand mind. 4 Wochen |                          |                          |          |  |   |               |
| <b>Diphtherie (DIP)<br/>Tetanus (TET)<br/>Pertussis (PEA)<br/>Poliomyelitis (IPV)<br/>Haemophilus infl. B (HiB)<br/>Hepatitis B (HBV)</b> |  | 1.<br>6-fach-<br>Impfung | 2.<br>6-fach-<br>Impfung |          |  | 3.<br>6-fach-Impfung<br>frühestens<br>6 Monate nach 2.<br>Teilimpfung |               |
| <b>Pneumokokken (PNC)</b>   |  | 1.<br>PNC                | 2.<br>PNC                |          |  | 3.<br>PNC<br>frühestens<br>6 Monate nach<br>2. Teilimpfung            |               |
| <b>Mumps<br/>Masern (MMR)<br/>Röteln</b>  |  |                          |                          |          | MMR<br>2 Impfungen, Abstand mind. 4 Wochen |   |               |

Impfkalender des kostenfreien Kinderimpfprogramms für Säuglinge und Kleinkinder

### Schulkinder

| Alter→<br>↓ Impfung   | 7. Jahr  | 8. Jahr  | 9. Jahr | 10. Jahr | 11. Jahr             | 12. Jahr | 13. Jahr                            | 14. Jahr | 15. Jahr |
|---|--|--|---------|----------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|
| <b>Diphtherie (dip)<br/>Tetanus (TET)<br/>Pertussis (PEA)<br/>Poliomyelitis (IPV)</b> | 4-fach-<br>Impfung                                 | nachholen bei Kindern, die im 7. Lebensjahr nicht geimpft wurden |         |          |                      |          | 1                                   |          |          |
| <b>Hepatitis B (HBV)</b>  | Grundimmunisierung (0/1/6 Monate) oder auffrischen |  |         |          |                      |          |                                     |          |          |
| <b>Mumps<br/>Masern (MMR)<br/>Röteln</b>  | MMR nachholen                                      |  |         |          |                      |          |                                     |          |          |
| <b>Meningokokken (MEC4)</b>   |  |  |         |          |                      | MEC4     |                                     |          |          |
| <b>Humane Papillomaviren (HPV)<sup>2</sup></b>  |  |  |         |          | 2 x HPV (0/6 Monate) |          | 2 x HPV <sup>3,4</sup> (0/6 Monate) |          |          |

Impfkalender des kostenfreien Kinderimpfprogramms für Schulkinder

<sup>1</sup> Kinder, die im 7.-9. Lebensjahr nur eine dip-Tet-IPV-Impfung erhalten haben, sollen spätestens bei Schulaustritt eine Impfung mit einer Pertussiskomponente erhalten.

<sup>2</sup> Die HPV Impfung im 1+1 Schema, soll so früh wie möglich ab dem vollendeten 9. Lebensjahr begonnen werden.

<sup>3</sup> Catch-up Programm, ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zu einem günstigen Selbstkostenpreis.

<sup>4</sup> Empfehlung für das 15. Lebensjahr stützt sich auf Empfehlungen gemäß der Weltgesundheitsorganisation, WHO: <http://www.who.int/entity/wer/2014/wer8943.pdf?ua=1>; abweichend von der derzeit gültigen Fachinformation.

## 2. Impfkalender aller allgemein empfohlenen Impfungen

### Säuglinge und Kleinkinder

| Alter→<br>↓Impfung  | 1. Lebensjahr  |                          |                          |        |        |  |                          | 2. Lebensjahr   |         |             | 5. Jahr | 6. Jahr |  |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------|--------|--|--------------------------|---|---------|-------------|---------|---------|--|
|   | 7. Wo  | 3. Mo.                   | 5. Mo.                   | 6. Mo. | 7. Mo. | 11. Mo.                                    | 12. Mo.                  | 13. Mo.   | 14. Mo. | 20.-24. Mo. |         |         |  |
| <b>Rotavirus (RV)</b>   | RV<br>2 bzw. 3 in Abhängigkeit vom verwendeten Impfstoff, Abstand mind. 4 Wochen |                          |                          |        |        |  |                          |   |         |             |         |         |  |
| <b>Diphtherie (DIP)<br/>Tetanus (TET)<br/>Pertussis (PEA)<br/>Poliomyelitis (IPV)<br/>Haemophilus infl. B (HiB)<br/>Hepatitis B (HBV)</b> |  | 1.<br>6-fach-<br>Impfung | 2.<br>6-fach-<br>Impfung |        |        |  |                          | 3.<br>6-fach-Impfung<br>frühestens<br>6 Monate nach<br>2. Teilimpfung |         |             |         |         |  |
| <b>Pneumokokken (PNC)</b>   |  | 1.<br>PNC                | 2.<br>PNC                |        |        |  |                          | 3. PNC<br>frühestens<br>6 Monate nach<br>2. Teilimpfung               |         |             |         |         |  |
| <b>Mumps<br/>Masern (MMR)<br/>Röteln</b>  |  |                          |                          |        |        | MMR<br>2 Impfungen, Abstand mind. 4 Wochen |                          |   |         |             |         |         |  |
| <b>Meningokokken<sup>1,2</sup></b>  |  |                          |                          |        |        |  |                          | 1 x MEC-C   |         |             |         |         |  |
| <b>FSME</b>   |  |                          |                          |        |        |  |                          | 1. FSME   | 2. FSME | 3. FSME     | FSME    |         |  |
| <b>Varizellen (VZV)</b>   |  |                          |                          |        |        |  |                          | VZV<br>2 Impfungen, Abstand mind. 4,<br>vorzugsweise 6 Wochen         |         |             |         |         |  |
| <b>Hepatitis A (HAV)</b>  |  |                          |                          |        |        |  |                          | HAV<br>2 Impfungen, Abstand 12 Monate                                 |         |             |         |         |  |
| <b>Influenza (IV)<sup>3</sup></b>   |  |                          |                          |        |        |  | IV jährlich <sup>4</sup> |   |         |             |         |         |  |

Impfkalender aller empfohlenen Impfungen für Säuglinge und Kleinkinder

Kostenfrei
  Nicht kostenfrei
  Indikationsimpfung (nicht kostenfrei)

<sup>1</sup> MEC-C: konjugierter MenC Impfstoff bei Erstimpfung ab dem vollendeten 12. Lebensmonat nur eine Dosis (kann ab dem vollendeten 2. Lebensmonat erstmals geimpft werden, dann 2 Dosen im Abstand von mind. 8 Wochen).

<sup>2</sup> MenB: Individualimpfung ab dem vollendeten 2. Lebensmonat; Indikationsimpfung für Risikopersonen; siehe Kapitel Meningokokken

<sup>3</sup> IV: bei Kindern werden bei Erstimmunisierung (bis zum vollendeten 8. Lebensjahr) 2 Impfungen mit mind. 4 Wochen Abstand empfohlen.

<sup>4</sup> Ab vollendeten 2. Lebensjahr nasaler Influenza-Lebendimpfstoff

## Schulkinder

| Alter→<br>↓Impfung  | 7. Jahr            | 8. Jahr   | 9. Jahr       | 10. Jahr | 11. Jahr                | 12. Jahr | 13. Jahr | 14. Jahr                               | 15. Jahr |  |
|---|--------------------|---|---------------|----------|-------------------------|----------|----------|--|----------|--|
| <b>Diphtherie (dip)</b><br><b>Tetanus (TET)</b><br><b>Pertussis (PEA)</b><br><b>Poliomyelitis (IPV)</b> | 4-fach-<br>Impfung | nachholen bei<br>Kindern, die im 7.<br>Lebensjahr nicht<br>geimpft wurden |               |          |                         |          |          | 1                                      |          |  |
| <b>Hepatitis B (HBV)</b>  |                    | Grundimmunisierung (0/1/6 Monate) oder auffrischen                        |               |          |                         |          |          |  |          |  |
| <b>Mumps</b><br><b>Masern (MMR)</b><br><b>Röteln</b>  |                    | MMR nachholen   |               |          |                         |          |          |  |          |  |
| <b>Humane Papillo-<br/>maviren (HPV)<sup>2</sup></b>  |                    |   |               |          | 2 x HPV<br>(0/6 Monate) |          |          | 2 x HPV <sup>3,4</sup><br>(0/6 Monate) |          |  |
| <b>Varizellen (VZV)</b>   |                    |   | VZV nachholen |          |                         |          |          |  |          |  |
| <b>FSME</b>   |                    |   |               | FSME     |                         |          |          |  |          |  |
| <b>Meningokokken<sup>5</sup><br/>(MEC4)</b>   |                    |   |               |          | MEC4                    |          |          |  |          |  |
| <b>Influenza (IV)</b>   | IV jährlich        |   |               |          |                         |          |          |  |          |  |

Impfkalender aller empfohlenen Impfungen für Schulkinder

<sup>1</sup> Kinder, die im 7.-9. Lebensjahr nur eine dip-Tet-IPV-Impfung erhalten haben, sollen spätestens bei Schulaustritt eine Impfung mit einer Pertussiskomponente erhalten.

<sup>2</sup> Die HPV Impfung im 1+1 Schema, soll so früh wie möglich ab dem vollendeten 9. Lebensjahr begonnen werden.

<sup>3</sup> Catch-up Programm, ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zu einem günstigen Selbstkostenpreis.

<sup>4</sup> Empfehlung für das 15. Lebensjahr stützt sich auf Empfehlungen gemäß der Weltgesundheitsorganisation, WHO: <http://www.who.int/entity/wer/2014/wer8943.pdf?ua=1>; abweichend von der derzeit gültigen Fachinformation.

<sup>5</sup> Nachholschema für MenB: Individualimpfung und Indikationsimpfung für Risikopersonen siehe Kapitel Meningokokken

Kostenfrei       Nicht kostenfrei

## Erwachsene

Erwachsene mit vorliegender Grundimmunisierung gemäß den Empfehlungen\*

| Alter→<br>↓Impfung  | 18.-20. Jahr                | 30. Jahr | 40. Jahr | 50. Jahr | 60. Jahr | 65. Jahr                 | 70. Jahr | 75. Jahr | 80. Jahr<br>usw. |
|---|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|------------------|
| <b>Diphtherie (dip)</b><br><b>Tetanus (TET)</b><br><b>Pertussis (PEA)</b><br><b>Poliomyelitis (IPV)</b> | alle 10 Jahre auffrischen   |          |          |          |          | alle 5 Jahre auffrischen |          |          |                  |
| <b>Humane Papillo-<br/>maviren (HPV)</b>  | gegebenenfalls<br>nachholen |          |          |          |          |                          |          |          |                  |
| <b>Mumps</b><br><b>Masern(MMR)</b><br><b>Röteln</b>   | gegebenenfalls<br>nachholen |          |          |          |          |                          |          |          |                  |
| <b>FSME</b>   | alle 5 Jahre auffrischen    |          |          |          |          | alle 3 Jahre auffrischen |          |          |                  |
| <b>Pneumokokken</b>   | siehe Kapitel Pneumokokken  |          |          |          |          |                          |          |          |                  |
| <b>Herpes Zoster (HZV)</b>  | einmalige Gabe              |          |          |          |          |                          |          |          |                  |
| <b>Influenza (IV)</b>   | IV jährlich                 |          |          |          |          |                          |          |          |                  |

Impfkalender aller empfohlenen Impfungen für Erwachsene

\* Für Personen, bei denen die Grundimmunisierung ganz oder teilweise fehlt, siehe auch Kapitel „Impfabstände-Nachholimpfungen“.